

ใบประกอบการสั่งใช้ยา Ciprofloxacin Lactate 200 mg/100 ml inj. (ED ง)

โรงพยาบาลบึงบูรพ์

ชื่อ - สกุลผู้ป่วย.....HN

อายุ.....ปี น้ำหนัก.....kg. เพศ ชาย หญิง

ประวัติการแพ้ยา ไม่มี มี คือ.....

ผลการวินิจฉัย.....

ข้อบ่งใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ 2562 ระบุเงื่อนไขการใช้ดังนี้

- ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ไม่สามารถใช้อากลุ่ม beta-lactam และ/หรือยากลุ่ม aminoglycoside ได้
- ใช้เป็น empiric therapy ใน 3 วันแรกของการรักษาร่วมกับยากลุ่ม beta-lactam และ/หรือ aminoglycoside ในการรักษา severe hospital-acquired pneumonia ในกรณีที่ไม่สามารถรับประทานยาได้

ขนาดยาและวิธีการใช้ยา

- Bone/joint infections: Mild/moderate: 400 mg every 12 hours for 4-6 weeks
Severe/complicated: 400 mg every 8 hours for 4-6 weeks
- Endocarditis due to HACEK organisms (AHA guidelines, unlabeled use): Note: Not first-line option; use only if intolerant of beta-lactam therapy: 400 mg every 12 hours for 4 weeks
- Febrile neutropenia: 400 mg every 8 hours for 7-14 days
- Intra-abdominal : 400 mg every 12 hours for 7-14 days
- Lower respiratory tract, skin/skin structure infections: Mild/moderate: 400 mg every 12 hours for 7-14 days Severe/complicated: 400 mg every 8 hours for 7-14 days
- Nosocomial pneumonia: 400 mg every 8 hours for 10-14 days
- Urinary tract infection:
 - () Acute uncomplicated, cystitis: 200 mg every 12 hours for 7-14 days
 - () Complicated (including pyelonephritis): 400 mg every 12 hours for 7-14 days

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยไต

Estimated CrCl (mL/min/1.73 m(2))	IV Ciprofloxacin Dose
Greater than 60	400 mg every 8 hours
31 to 60	400 mg every 12
hours Less than or equal to 30	400 mg every 24 hours

ข้อห้ามใช้

- Hypersensitivity to ciprofloxacin, any component of the formulation, or other quinolones;
- concurrent administration of tizanidine

แพทย์ผู้สั่งใช้ยา.....
(.....)
วันที่...../...../.....

การประเมินผล : ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์

เอกสารอ้างอิง

Micromedex ,Lacy CF, Armstrong LL,Goldman MP and Lance LL.Drug Information Handbook international.13 th ed.Ohio:lexi-comp;2005-2006:894-95.

การประเมินการใช้ยา Ciprofloxacin 200 mg inj.


Drug Use Evaluation (DUE)

โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ปีงบประมาณ 2568 (ต.ค.67 – ม.ค.68)

Criteria ที่ประเมิน	0 (ราย)		คิดเป็นร้อยละ	
	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม
ข้อบ่งใช้ (Use)	2	0	100.00%	0.00%
ขนาดยา (Dose)	2	0	100.00%	0.00%
ระยะเวลาที่ให้ยา (Duration)	2	0	100.00%	0.00%
ข้อห้ามใช้ (C/I)	2	0	100.00%	0.00%
ปฏิกิริยาระหว่างยา (D/I)	2	0	100.00%	0.00%
รวม Criteria ทุกข้อ	2	0	100.00%	0.00%


กราฟที่ 1 แสดงจำนวนการสั่งใช้ยา Ciprofloxacin inj Tablets ในโรคต่างๆ

โรค	จำนวนการสั่งใช้
Pneumonia	1
Cystitis	0
Cellulitis	0
Sepsis	0
UTI	0
Otitis media	0
Gastroenteritis	0
Abcess	0
Skin infection	1
Fever	0



แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนการสั่งใช้ยา Ciprofloxacin inj. Tablets ตามข้อบ่งใช้

ข้อบ่งใช้	จำนวนการสั่งใช้
Switch Therapy	1
Gram Negative	1
P.aeruginosa	0
Salmonella typhi	0
อื่นๆ	0



ร้อยละการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ปี	ร้อยละ
2568	100